



Formularul 46. Deservirea medicală a copiilor cu dizabilități

1. Repartizarea copiilor 0-17 ani 11 luni 29 zile cu dizabilități, aflați sub supraveghere și sub tratament



Mediana celor care se afla sub supraveghere(2014-2020) – 17

Mediana celor care au primit tratament(2014-2020) – 13




Mediana celor care se afla sub supraveghere(2020-2024) – 10

Mediana celor care au primit tratament(2020-2024) – 10

Între 2014 și 2020, numărul copiilor cu dizabilități (0-17 ani 11 luni 29 zile) aflați sub supraveghere la finele anului se menține în jurul unei mediane de 17, iar cei care primesc tratament de recuperare au o mediană de 13. În 2020 se înregistrează un salt semnificativ (145 de copii sub supraveghere, 139 în tratament), urmat de o scădere bruscă în 2021, când ambele valori se diminuează la 10. Până în 2024, acestea continuă să oscileze la niveluri mai mici (5-6 copii), stabilizându-se în jurul unei mediane de 10 atât pentru supraveghere, cât și pentru tratament. Această evoluție sugerează pe de o parte existența unor factori specifici anului 2020 (posibil de natură administrativă sau epidemiologică), iar pe de altă parte o diminuare a cazurilor înregistrate

ulterior, care poate reflecta fie îmbunătățirea accesului la servicii de recuperare, fie modificări în metodologie și raportare.

2. Repartizarea copiilor 0-17 ani 11 luni 29 zile cu dizabilități, aflați sub supravegere după categoria de vârstă.




Mediana 0-3 ani (2014-2020) – 2

Mediana 3-6 ani (2014-2020) – 3

Mediana 7-15 ani (2014-2020) – 12

Mediana 16-17 ani fete (2014-2020) – 1

Mediana 16-17 ani băieți (2014-2020) – 0



Mediana 0-3 ani (2020-2024) – 0

Mediana 3-6 ani (2020-2024) – 3

Mediana 7-15 ani (2020-2024) – 5


Mediana 16-17 ani fete (2020-2024) – 1

Mediana 16-17 ani băieți (2020-2024) – 1

Între 2014 și 2020, copiii cu dizabilități din categoria 7–15 ani reprezintă cel mai numeros segment, cu o mediană de 12, în timp ce grupele de 0–3 și 3–6 ani ating valori mai mici (2 și, respectiv, 3). Pentru adolescenți, se observă o diferență de gen: fetele de 16–17 ani au o mediană de 1 caz, iar băieții din aceeași grupă de vârstă nu apar în date (mediană 0).

După 2020, ponderea copiilor de 7–15 ani scade semnificativ (mediană 5), iar la categoria de 0–3 ani dispare practic orice caz (mediană 0). În schimb, segmentul de 3–6 ani rămâne constant (3), iar la 16–17 ani se evidențiază o ușoară creștere a cazurilor de băieți (mediană 1), egalându-le practic pe cele ale fetelor. Această evoluție sugerează fie o modificare a criteriilor de înregistrare, fie o schimbare reală a structurii de vârstă în rândul copiilor cu dizabilități aflați sub supraveghere.

3. Repartizarea copiilor 0-17 ani 11 luni 29 zile cu dizabilități, aflați sub supraveghere și care au primit tratament în funcție de boală.



Mediana bolilor aparatului respirator(2014-2020) – supraveghere - 1, tratament – 1

Mediana bolilor sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv (2014-2020) – supraveghere - 1, tratament – 0

Mediana bolilor aparatului genito-urinar (2014-2020) – supraveghere - 2, tratament – 1


Mediana malformațiilor congenitale, deformații și anomalii cromosomiale (2014-2020) – supraveghere – 4.5 ,tratament – 4

Mediana malformațiilor congenitale ale aparatului circulator (2014-2020) – supraveghere - 4, tratament – 4

Mediana malformațiilor congenitale și deformațiilor sistemului osteo-muscular (2014-2020) – supraveghere - 1, tratament – 0

Între 2014 și 2020, dintre copiii cu dizabilități aflați sub supraveghere, cele mai frecvente afecțiuni sunt malformațiile congenitale și anomalii cromosomiale, cu o mediană de aproximativ 4–5 cazuri, urmate de malformațiile aparatului circulator (4 cazuri) și de cele ale sistemului osteo-muscular (1 caz). În ceea ce privește tratamentul de recuperare, domină în continuare malformațiile congenitale (cu circa 4 cazuri mediane), în timp ce bolile aparatului respirator, genito-urinar și osteo-articular înregistrează valori mai mici (1–2 cazuri). Această ierarhie indică faptul că, pe parcursul perioadei analizate, cele mai mari nevoi de supraveghere și intervenție

medicală revin copiilor cu malformații congenitale, în special de tip cardiovascular și osteo-muscular, precum și celor cu anomalii cromosomiale.



Mediana bolilor aparatului respirator(2020-2024) – supraveghere - 1, tratament – 1

Mediana bolilor sistemului osteo-articular, ale mușchilor și țesutului conjunctiv (2020-2024) – supraveghere - 1, tratament – 1

Mediana bolilor aparatului genito-urinar (2020-2024) – supraveghere - 0, tratament – 0



Mediana malformațiilor congenitale, deformații și anomalii cromosomiale (2020-2024) – supraveghere – 4 ,tratament – 4

Mediana malformațiilor congenitale ale aparatului circulator (2020-2024) – supraveghere - 4, tratament – 4

Mediana malformațiilor congenitale și deformațiilor sistemului osteo-muscular (2020-2024) – supraveghere – 0, tratament – 0


Între 2020 și 2024, copiii cu dizabilități care prezintă malformații congenitale, deformații și anomalii cromosomiale, precum și malformații cardiace, sunt cei mai numeroși atât în rândul celor aflați sub supraveghere (mediană de 4), cât și al celor care primesc tratament de recuperare (mediană tot de 4). Prin comparație, bolile aparatului respirator și cele osteo-articulare ating valori mediane mai reduse, de 1 pentru fiecare categorie, în timp ce bolile aparatului genito-urinar și malformațiile osteo-musculare figurează cu valori nule. Astfel, principalele nevoi de îngrijire și terapie revin copiilor cu malformații congenitale și anomalii cromosomiale, fiind dominante în această perioadă.

4. Statistica bolilor în funcție de sex.



Între 2014 și 2024, numărul de cazuri de boli la copii, analizate în funcție de sex, rămâne în general scăzut și relativ constant, însă se disting câteva tendințe. Tulburările mentale și de comportament înregistrează cele mai evidente variații, fiind mai frecvente în rândul băieților (de pildă, în 2017 și 2021 se observă un vârf de până la 6 cazuri în cazul băieților, față de doar 2–3 la fete). În schimb, afecțiunile endocrine, metabolice (inclusiv diabetul) și tumorile se mențin la valori reduse, cu diferențe minore între fete și băieți. Alte categorii, precum epilepsia, bolile sistemului nervos și cele ale căilor respiratorii, apar sporadic, fără a atinge valori semnificative într-un anumit an sau pentru un anumit sex. În ansamblu, datele sugerează o stabilitate a patologiei pediatric-adolescentine, cu unele episoade punctuale de creștere a cazurilor de tulburări mentale și de comportament în rândul băieților.

5. Statistica bolilor în funcție de an.



Mediana bolilor infecțioase și parazitare (2014-2020) – 1

Mediana SIDA (2014-2020) - 0

Mediana tumori (2014-2020) – 1

Mediana tumori maligne (2014-2020) – 0

Mediana bolilor endocrine, de nutriție și metabolism (2014-2020) – 0

Mediana diabetului zaharat (2014-2020) – 0

Mediana afecțiunilor glandei tiroide (2014-2020) – 0

Mediana tulburărilor mentale și de comportament (2014-2020) – 3


Mediana epilepsiilor cu tulburări mentale și de comportament (2014-2020) – 2

Mediana retardului mental (2014-2020) – 0

Mediana bolilor sistemului nervos (2014-2020) – 1

Mediana bolilor ochiului și anexelor sale (2014-2020) – 1

Între 2014 și 2020, categoria cu cea mai mare mediană este reprezentată de tulburările mintale și de comportament (3 cazuri), urmată de epilepsia asociată cu aceste tulburări (2 cazuri). Bolile infecțioase și parazitare, tumorile, bolile sistemului nervos și cele ale ochiului și anexelor sale înregistrează mediana 1, în timp ce alte categorii, precum SIDA, tumorile maligne, bolile endocrine și metabolice, diabetul și retardul mental, apar cu valori mediane nule. Astfel, deși numărul cazurilor rămâne redus în ansamblu, datele subliniază o incidență relativ mai mare a problemelor psihiatrice și a epilepsiei, care devin mai vizibile spre finalul intervalului analizat (2019-2020).



Mediana bolilor infecțioase și parazitare (2020-2024) – 0

Mediana SIDA (2020-2024) – 0

Mediana tumori (2020-2024) – 1

Mediana tumori maligne (2020-2024) – 0

Mediana bolilor endocrine, de nutriție și metabolism (2020-2024) – 2

Mediana diabetului zaharat (2020-2024) – 2

Mediana afecțiunilor glandei tiroide (2020-2024) – 0

Mediana tulburărilor mentale și de comportament (2020-2024) – 0

Mediana epilepsiilor cu tulburări mentale și de comportament (2020-2024) – 0

Mediana retardului mental (2020-2024) – 0

Mediana bolilor sistemului nervos (2020-2024) – 1


Mediana bolilor ochiului și anexelor sale (2020-2024) – 0

Mediana bolilor urechii și a apofizei mastoide (2020-2024) – 0

Mediana surdității (2020-2024) – 0

Între 2020 și 2024, majoritatea categoriilor de boli au mediane egale cu zero, ceea ce înseamnă că, în cel puțin jumătate din intervalul analizat, nu s-au înregistrat cazuri sau acestea au fost raportate doar punctual. Se remarcă, totuși, câteva excepții: tumorile (mediană 1), bolile endocrine, de nutriție și metabolism (mediană 2), diabetul zaharat (mediană 2) și bolile sistemului nervos (mediană 1). Aparenta discrepantă dintre aceste mediane relativ mici și vârfurile raportate într-un singur an (cum este, de pildă, creșterea bruscă a tulburărilor mintale și de comportament în 2022) indică faptul că respectivele valori ridicate reprezintă mai degrabă cazuri izolate sau specifice unui singur an, fără a modifica distribuția generală pe toată perioada. Astfel, din punct de vedere statistic, patternul global rămâne dominat de lipsa cazurilor sau de un număr foarte mic al acestora la nivel de categorie, în majoritatea anilor.


6. Statistica anuală a bolilor în funcție de gravitate și sex.



Mediana afecțiunilor severe (2014-2020) – 1

Mediana afecțiunilor accentuate (2014-2020) – 1

Mediana afecțiunilor medii (2014-2020) – 13



Mediana afecțiunilor severe (2020-2024) – 0

Mediana afecțiunilor accentuate (2020-2024) – 0

Mediana afecțiunilor medii (2020-2024) – 8

Între 2014 și 2020, cazurile de afecțiuni medii se dovedesc a fi dominante, cu o mediană de 13, în contrast cu cele severe și accentuate, care rămân la o mediană de câte un caz în fiecare an. În 2020 se remarcă un vârf al afecțiunilor medii, care ajung la 49 de cazuri, dintre care aproximativ o treime sunt la femei. După 2020, se observă o scădere bruscă a afecțiunilor severe și accentuate (ambele cu mediană 0), iar afecțiunile medii coboară treptat, stabilizându-se la o mediană de 8 în intervalul 2020–2024. Această evoluție poate semnala fie o îmbunătățire a stării de sănătate în rândul populației monitorizate, fie schimbări în sistemul de înregistrare și clasificare a gravității bolilor.