


Formularul 29. Hepatite cronice și ciroze hepatice

Contingentul bolnavilor, aflați sub supraveghere în instituția medico-sanitară (Adulți)

1. Evoluția numărului de pacienți cu ciroze și hepatite cronice




Mediana hepatitelor cronice virale (2014-2020) – 13.5

Mediana hepatitelor cronice nevrale (2014-2020) – 4.5

Mediana cirozelor hepatice virale (2014-2020) – 2

Mediana cirozelor hepatice nevrale (2014-2020) – 3



Mediana hepatitelor cronice virale (2020-2024) – 21.5


Mediana hepatitelor cronice nevrale (2020-2024) – 2.5

Mediana cirozelor hepatice virale (2020-2024) – 0.5

Mediana cirozelor hepatice nevrale (2020-2024) – 0

În perioada 2014-2020, numărul pacienților adulți cu hepatite cronice și ciroze hepatice rămâne relativ moderat, cu o prevalență mai ridicată a formelor virale decât a celor nevrale. Valorile mediane pentru hepatitele cronice virale (13,5) și pentru cirozele hepatice virale (2) indică o răspândire mai mare a etiologiei virale, în timp ce hepatitele și cirozele nevrale prezintă valori mai scăzute (4,5 și 3). După 2020, se constată o creștere vizibilă a tuturor categoriilor, mai accentuată în cazul hepatitelor cronice virale (media urcă la 21,5), sugerând fie o creștere reală a incidenței, fie o mai bună detectare și raportare a acestor afecțiuni. În același timp, formele nevrale și cirozele în general înregistrează o scădere, reflectând o tendință descendentă per ansamblu a patologiilor hepatice în intervalul 2020-2024.

2. Evoluția numărului de pacienți hepatite cronice și cauzele acestora.




Mediana hepatitelor cronice virale (2014-2020) – 20

Mediana hepatiteliilor cronice provocate de virusul B (2014-2020) – 14

Mediana hepatiteliilor cronice provocate de virusul C (2014-2020) – 6

Mediana hepatitelor cronice nevirale (2014-2020) – 5



Mediana hepatitelor cronice virale (2020-2024) – 21.5

Mediana hepatiteliilor cronice provocate de virusul B (2020-2024) – 12


Mediana hepatiteliilor cronice provocate de virusul C (2020-2024) – 8

Mediana hepatitelor cronice nevirale (2020-2024) – 2.5

În perioada 2014-2020 se înregistrează o mediană de 20 de cazuri de hepatite cronice de tip viral, dintre care majoritatea sunt determinate de virusul B (14 cazuri), iar restul de virusul C (6 cazuri). În același interval, hepatitele cronice de tip neviral apar cu o frecvență mai scăzută, mediana ajungând la 5 cazuri.

Ulterior, în perioada 2020-2024, se observă o ușoară creștere a cazurilor virale, mediana ajungând la 21.5. Totodată, se remarcă o schimbare în distribuția etiologică: cazurile provocate de virusul B scad la 12, în timp ce cele asociate virusului C cresc la 8, iar formele nevirale scad considerabil, la o mediană de 2.5. Această evoluție sugerează o modificare a profilului patologic, cu o predominanță continuă a hepatitelor virale, dar cu o schimbare notabilă în raportul între virusurile B și C, precum și o reducere semnificativă a formelor nevirale.

3. Evoluția numărului de pacienți ciroze hepatice și cauzele acestora.




Mediana cirozelor hepatice virale (2014-2020) – 2

Mediana cirozelor hepatice provocate de virusul B (2014-2020) – 0

Mediana cirozelor hepatice provocate de virusul C (2014-2020) – 2

Mediana cirozelor hepatice nevirale (2014-2020) – 3



Mediana cirozelor hepatice virale (2020-2024) – 0.5

Mediana cirozelor hepatice provocate de virusul B (2020-2024) – 0

Mediana cirozelor hepatice provocate de virusul C (2020-2024) – 0.5

Mediana cirozelor hepatice nevirale (2020-2024) – 0

În perioada 2014-2020, evoluția cirozelor hepatice se caracterizează printr-o prezență modestă a formelor virale, cu o mediană de 2 cazuri, toate acestea fiind determinate de virusul C, întrucât nu se înregistrează ciroze provocate de virusul B. În același interval, cirozele de origine nevirală sunt puțin mai frecvente, atingând o mediană de 3 cazuri. Ulterior, în perioada 2020-2024, se remarcă o scădere accentuată a acestor valori: cirozele hepatice virale scad la o mediană de doar 0.5 cazuri, iar, specific, cazurile legate de virusul C se reduc la 0.5, menținându-se absența celor provocate de virusul B. Totodată, cirozele de origine nevirală practic dispar, cu o mediană de 0 cazuri. Această evoluție indică o reducere semnificativă a incidenței cirozelor hepatice, ceea ce ar putea reflecta îmbunătățiri în diagnosticare, intervenții terapeutice mai eficiente sau măsuri preventive mai riguroase aplicate în ultimii ani.